

Krasovsky K (2012) Mortality decline in Ukraine in 2008-2010 Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe 2 (Supplement 1, 2nd conference 'Economics, sociology, theory and practice of public health'):s6. doi:10.6084/m9.figshare.92832

Mortality decline in Ukraine in 2008-2010

Krasovsky, Konstantin

KEY WORDS: mortality, Ukraine, alcohol, health policy.

ABOUT THE AUTHOR: Konstantin Krasovsky is the head of Tobacco Control unit at the Ukrainian insti-

tute for strategic research of the Ministry of Health of Ukraine, krasovskyk@gmail.com

This paper was received 07.03.2012, accepted 09.04.2012, published 10.07.2012.

Снижение смертности в Украине в 2008-2010 годах

Красовский Константин Сергеевич

УДК 314.14-026.24: 613.81](477)"2008/2010"

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смертность, Украина, алкоголь, политика здравоохранения

ОБ АВТОРЕ: Красовский Константин Сергеевич - Заведующий сектором контроля над табаком, Украинский институт Стратегических исследований министерства здравоохранения Украины, krasovskyk@gmail.com

Зменшення смертності серед населення України у 2008-2010 роках

Красовський Костянтин Сергійович

АКТУАЛЬНІСТЬ: У 2010 році в Україні вперше з 1992 року кількість смертей становила менше 700 тисяч. Загалом за два роки (2008-2010) кількість смертей скоротилася майже на 56 тисяч, а смертність – з 16,3 до 15,2 на 1000 осіб.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ: Було проаналізовані дані Держстату щодо смертності від різних причин у 2008-2010 роках серед статевікових груп населення України.

РЕЗУЛЬТАТИ: Смертність за два роки найбільше зменшилася серед людей середнього віку: серед 40-річних чоловіків – на 30%, серед 30-річних жінок – на 25%. Серед осіб старше 70 років смертність скоротилася лише на 1%, а серед осіб молодше 16 років – на 10%. Тому подальший аналіз було сконцентровано на смертності людей працездатного віку (16-59 років для чоловіків, 16-55 років для жінок), серед яких смертність загалом скоротилася на 25%. Найбільше скоротилася смертність від усіх 8 зазначених у переліку Держстату причин, які містять слово «алкоголь»: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю (на 57%); алкогольна хвороба печінки (на 52%); алкогольна кардіоміопатія (на 52%); випадкове отруєння та дія алкоголю (на 50%) тощо. Серед інших причин суттєво скоротилася смертність від непрямі пов'язаних з алкоголем причин: пневмонії (на

36%), «неалкогольних» хвороб печінки (на 34%), туберкульозу (на 29%) та від різноманітних нещасних випадків, таких як: спричинені дією вогню (на 48%), випадкові падіння (на 43%), ДТП (на 40%) тощо.

ОБГОВОРЕННЯ: В Україні раніше спостерігалось два періоди суттєвого зменшення смертності: у 1986-1988 та 1996-1998 роках. Тоді смертність також переважно зменшувалася серед людей середнього віку і в більшій мірі від причин, прямо та непрямі пов'язаних з алкоголем. Зменшення смертності в Україні у 2008-2010 роках, напевно, в першу чергу пов'язано зі зменшенням споживання алкоголю серед населення. Це зменшення споживання було викликано економічною кризою та підвищенням алкогольних акцизів, що разом суттєво зменшило цінову доступність алкогольних напоїв.

ВИСНОВКИ: Для подальшого зменшення смертності в Україні варто підсилити ефективні заходи, які призводять до зменшення споживання алкоголю серед населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: смертність, Україна, алкоголь.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА: Красовський Костянтин Сергійович, Завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, викладач ШОЗ НаУКМА, krasovskyk@gmail.com